

Taxon	Nom commun
<i>Acer negundo</i> L.	Érable négondo
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailante glanduleux
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambroisie annuelle
<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Aster lancéolé
<i>Aster novi-belgii</i> L.	Aster de Virginie
<i>Aster salignus</i> Willd.	Aster à feuilles de saule
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azolle fausse-filicule
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Baccharide à feuilles d'arroche [Séneçon en arbre]
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Bertéroa blanche
<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident à fruits noirs
<i>Bidens frondosa</i> L. var. <i>anomala</i> Porter ex Fernald	Bident à fruits noirs (var.)
<i>Bidens frondosa</i> L. var. <i>frondosa</i>	Bident à fruits noirs (var.)
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Buddléie de David [Arbre aux papillons]
<i>Conyza bilbaoana</i> J. Rémy	Conyze de Bilbao
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	Conyze du Canada
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Conyze de Sumatra
<i>Corispermum pallasii</i> Steven	Corisperme à fruits ailés
<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	Dittriche fétide
<i>Elodea callitrichoides</i> (L.C.M. Rich.) Caspary	Elodée fausse-callitriche

<i>Elodea canadensis</i> Michaux	Élodée du Canada
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St John	Élodée de Nuttall
<i>Fallopia xbohemica</i> (Chrtek et Chrtková) J.P. Bailey [<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene x <i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene]	Vrillée de Bohème [Renouée de Bohème]
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene	Vrillée du Japon [Renouée du Japon]
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene var. <i>japonica</i>	Vrillée du Japon (var.) [Renouée du Japon]
<i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene	Vrillée de Sakhaline [Renouée de Sakhaline]
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey	Fétuque à feuilles rudes
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey var. <i>brevipila</i>	Fétuque à feuilles rudes (var.)
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey var. <i>multinervis</i> (Stohr) Dengler	Fétuque à feuilles rudes (var.)
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. et Lev.	Berce du Caucase
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Épervière orangée
<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.	Balsamine de Balfour
<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	Balsamine du Cap

<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Balsamine géante
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Balsamine à petites fleurs
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	Lagarosiphon élevé [Lagarosiphon ; Élodée à feuilles alternes]
<i>Lemna minuta</i> Humb., Bonpl. et Kunth	Lenticule minuscule
<i>Lemna turionifera</i> Landolt	Lenticule à turion
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michaux) Greuter et Burdet	Ludwigie à grandes fleurs [Jussie à grandes fleurs]
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Ludwigie fausse-péplide (s.l.)
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H. Raven	Ludwigie de Montevideo [Jussie fausse-péplide]
<i>Lycium barbarum</i> L.	Lyciet de Barbarie
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonie à feuilles de houx
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Velloso) Verdc.	Myriophylle du Brésil
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Prunier tardif [Cerisier tardif]
<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Rhododendron pontique
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia
<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Rosier rugueux
<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	Patience à fleurs en thyrses [Oseille à oreillettes]

<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Séneçon du Cap
<i>Solidago canadensis</i> L.	Solidage du Canada [Gerbe d'or]
<i>Solidago gigantea</i> Ait.	Solidage glabre
<i>Spartina townsendii</i> H. et J. Groves	Spartine anglaise
<i>Spartina townsendii</i> H. et J. Groves var. <i>anglica</i> (C.E. Hubbard) Lambinon et Maquet	Spartine anglaise (var.)
<i>Spartina townsendii</i> H. et J. Groves var. <i>townsendii</i>	Spartine anglaise (var.)